



# Sociedad Paraguaya de Infectología.

Fundada el 1 de diciembre de 1993.

Inscripta en los Reg. De Personas Jurídicas y Asociaciones  
bajo el N°1004 Folio 8657, el 1 de octubre del 2001.

## COMUNICADO

En relación al **DENGUE**, la Sociedad Paraguaya de Infectología recuerda cuanto sigue:

- 1- **NO EXISTE EVIDENCIA CIENTÍFICA QUE AVALE EL USO DE IVERMECTINA PARA EL DENGUE**, la cual a dosis elevadas puede causar efectos clínicos que incluyen síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Las sobredosis se asocian con hipotensión y efectos neurológicos como confusión, alucinaciones, convulsiones, coma y muerte. La ivermectina puede potenciar los efectos de otros fármacos que causan depresión del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas y los barbitúricos.
- 2- El Dengue es una enfermedad viral, producida por el virus del Dengue, existiendo 4 serotipos. Es transmitida por la picadura del mosquito *Aedes aegypti*, cuyas larvas se desarrollan principalmente en agua estancada.
- 3- Tiene 3 fases: Fase febril, crítica y de convalecencia. La fase crítica suele iniciarse con la desaparición de la fiebre (alrededor del 3er al 5to día de la enfermedad) y suele reconocerse con la aparición de signos de alarma.
- 4- El antecedente de haber tenido Dengue en el pasado es un factor de riesgo para desarrollar Dengue Grave.
- 5- Pueden producirse casos severos, con compromiso de órganos, como encefalitis, miocarditis, hepatitis, shock por dengue, entre otras.
- 6- Los signos de alarma incluyen:
  - a) Dolor abdominal intenso y continuo
  - b) Sangrado activo de mucosas o hemorragias espontáneas
  - c) Vómitos persistentes
  - d) Irritabilidad o somnolencia
- 7- La hidratación adecuada es el pilar del tratamiento, principalmente por vía oral, y por vía intravenosa si fuese necesario.
- 8- Toda medicación puede ser tóxica a dosis altas. La dosis máxima diaria de paracetamol es 4g/día, habitualmente se indica 500mg cada 6hs. Están contraindicados el ácido acetilsalicílico, diclofenac, naproxeno, esteroides.
- 9- En base a la evidencia disponible en la actualidad, no puede recomendarse el uso rutinario del extracto de la hoja de mamón u otras infusiones para tratar el dengue.
- 10- Eliminar criaderos de mosquitos para evitar la proliferación de casos de dengue.

### Bibliografía

- 1- CDC Health advisory. [https://emergency.cdc.gov/han/2021/pdf/CDC\\_HAN\\_449.pdf](https://emergency.cdc.gov/han/2021/pdf/CDC_HAN_449.pdf)
- 2- Lind JN, Lovegrove MC, Geller AI, Uyeki TM, Datta SD, Budnitz DS. Increase in Outpatient Ivermectin Dispensing in the US During the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Analysis. *J Gen Intern Med.* 2021 Jun 18:1–3. doi: 10.1007/s11606-021-06948-6.